



## Indicaciones para la donación dirigida de Sangre de Cordón Umbilical. Julio 2010.

1

### 1. Neoplásicas:

Leucemia aguda linfoblástica  
Leucemia aguda mieloblástica  
Leucemia mieloide crónica  
Síndromes mielodisplásicos  
Linfoma no-hodgkin  
Leucemia mieloide crónica juvenil  
Linfoma de Hodgkin  
Leucemia linfática crónica  
Leucemia mielo-monocítica juvenil  
Linfoma de Burkitt  
Leucemia bifenotípica  
Mieloma múltiple  
Enfermedad linfoproliferativa VEB  
Leucemia aguda promielocítica  
Linfoma de células del manto  
Linfocitosis hemofagocítica  
Sarcoma de Edwing  
Neuroblastoma

### 2. Insuficiencias medulares

Aplasia medular grave  
Anemia de Fanconi  
Osteopetrosis  
Anemia de Diamond-Blackfan  
Síndrome de Kostmann  
Trombocitopenia amegacariocítica  
Disqueratosis congénita  
Neutropenia congénita  
Síndrome de Shwachman-Diamond



Trombocitopenia congénita  
Mielofibrosis  
Disgenesia Reticular  
Anemia sideroblástica  
Talasemia  
Hemoglobinuria paroxística  
Drepanocitosis

2

### 3. Inmunodeficiencias

Inmunodeficiencia combinada severa  
Síndrome de Wiskott-Aldrich  
Síndrome HiperIgM ligado al X  
Inmunodeficiencia común variable  
Enfermedad linfoproliferativa ligada a X  
Disregulación poliendocrina ligada X  
Síndrome de Omenn  
Síndromes de DiGeorge; Griscelli; Nezelof  
Enfermedad de Chediack-Higasi  
Enfermedad granulomatosa crónica

### 4. Enfermedades metabólicas

Enfermedad de Hurler  
Adrenoleucodistrofia  
Enfermedad de Krabbe  
Leucodistrofia metacromática  
Síndrome de Maroteaux-Lamy  
Síndrome de Lesch-Nyhan  
Enfermedad de Tay Sach  
Alfa-manosidosis  
Enfermedad de Gaucher  
Síndrome de Hunter  
Enfermedad de Sanfilippo  
Enfermedad de Wolman  
Aspartilglucosaminuria  
Porfiria eritropoyética congénita  
Fucosidosis



Gangliosidosis  
Enf. de Hurler-Scheie  
Lipofucocinosis  
Sínd. de Morquio  
Mucopolisacaridosis  
Enf. de Neiman-Pick  
Enf. de Sandhoff  
Sialidosis  
Osteopetrosis infantil  
Galactosemia

## 5. Otras

Urticaria pigmentosa